

Agastache Black Adder : boutons sombres et épis violets

Black Adder associe des boutons presque noirs à de petites fleurs labiées bleu-violet. Cet hybride de jardin demande du soleil et surtout une excellente évacuation de l'eau en hiver. Le feuillage vert aromatique et les fleurs estivales ultérieures se développent à partir d'une jeune plante encore sans fleurs.



Scène de jardin créée par IA montrant une seule jeune plante d'après l'original. Le lot choisi détermine la quantité ; décor et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Agastache ‘Black Adder’

Agastache Black Adder : boutons sombres et épis violets

Black Adder associe des boutons presque noirs à de petites fleurs labiées bleu-violet. Cet hybride de jardin demande du soleil et surtout une excellente évacuation de l'eau en hiver. Le feuillage vert aromatique et les fleurs estivales ultérieures se développent à partir d'une jeune plante encore sans fleurs.



Scène de jardin créée par IA montrant une seule jeune plante d'après l'original. Le lot choisi détermine la quantité ; décor et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Nom botanique	Agastache ‘Black Adder’
Taille de livraison	Chaque pot : 9 cm · hauteur totale env. 10–25 cm · quantité selon le lot choisi
Durée de vie	Vivace de jardin à feuillage caduc ; hivernage dépendant du site
Classification botanique	Hybride de jardin ; aucune Agastache rugosa pure confirmée
Couleur des fleurs	Bleu-violet à rouge-violet fumé, issues de boutons très sombres
Floraison	De l'été à l'automne ; la RHS indique juillet à octobre
Hauteur	Environ 50–70 cm selon la boutique ; profils spécialisés env. 60–100 cm à titre indicatif
Plantation	De préférence au printemps après les fortes gelées, dans un sol bien ressuyé
Espacement	Repère de la boutique : environ 50 cm ; laisser de la place aux épis dressés
Emplacement	Ensoleillé, si possible abrité ; terre nourissante et très drainante

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Choisir un endroit ensoleillé et si possible abrité au jardin.	La floraison estivale dressée demande de la lumière et un bon point de départ pour l'hiver.
Sol	Préparer une zone racinaire bien drainante, sans stagnation hivernale.	Froid et terre mouillée peuvent particulièrement affecter Black Adder.
Plantation	Planter de préférence au printemps à la profondeur précédente et arroser.	La jeune vivace a le temps de s'enraciner avant la saison froide.
Arrosage	Vérifier régulièrement les jeunes mottes et arroser à fond quand la terre est sèche.	La tolérance à la sécheresse des plantes installées ne s'applique pas à la petite motte livrée.
Engrais	Ajuster modérément les nutriments au sol et, en pot, à l'étiquette.	De forts apports ne compensent ni le manque de lumière ni un mauvais drainage.
Fleurs	Retirer les pointes défleuries si souhaité, conserver le feuillage sain.	D'autres fleurs peuvent être favorisées sans promettre une date de refleuraison.
Hiver	Vérifier le drainage, protéger les racines de l'humidité persistante et abriter les pots dehors.	Une garantie universelle d'hivernage ne convient pas à cet hybride aimant la chaleur.
Taille de printemps	Reporter la taille complète au printemps et préserver les nouvelles pousses basales.	Les tiges restantes protègent la base ; elles peuvent être raccourcies auparavant si le vent les menace.

Un savoir qui grandit

Les boutons sombres font ressortir les fleurs

Black Adder porte des épis étroits et dressés. Boutons et calices très sombres servent de fond à de nombreuses petites fleurs labiées bleu-violet à rouge-violet fumé. La silhouette reste fine : ce n'est pas une grosse boule de fleurs ronde. Parmi des graminées fines et des vivaces voisines aux ramifications souples, elle dessine une verticale nette. Sous les fleurs se trouvent des feuilles vertes, pointues et dentées, dont le parfum aromatique peut se percevoir au toucher. Ce parfum est un caractère de jardin, pas une recommandation médicinale ou culinaire. La floraison va de l'été à l'automne ; la RHS indique juillet à octobre, mais le temps et le stade de développement peuvent en modifier le déroulement.

Un hybride de jardin sous un nom courant en boutique

La boutique présente l'offre comme *Agastache rugosa* Black Adder. Le profil RHS indique *Agastache* 'Blackadder', tandis que le Missouri Botanical Garden décrit un hybride d'*Agastache rugosa* et d'*Agastache foeniculum*. Le portrait le classe donc comme *Agastache* 'Black Adder', sans reprendre sans confirmation une *rugosa* pure. Blackadder et Black Adder sont ici deux graphies du même cultivar de jardin connu. Cette classification aide à rapprocher correctement différentes descriptions. Black Adder est une vivace herbacée caduque au port dressé. Son caractère vivace ne signifie toutefois pas qu'elle survivra sûrement à chaque hiver dans tous les jardins allemands. Drainage et emplacement sont essentiels.

La jeune plante ne porte pas encore d'épis

La photo originale inchangée montre quelques tiges vertes souples à feuilles dentées, sans inflorescence ouverte. L'offre comprend des lots de pots de 9 cm, de 10 à 25 cm de hauteur totale environ, contenant compris. L'effet de jardin se développe plus tard. La boutique donne une hauteur indicative de 50 à 70 cm, les profils spécialisés environ 60 à 100 cm ou une classe plus large. Prévois donc de l'espace au-dessus et autour lorsque la croissance est vigoureuse. Une hauteur maximale fixe ne peut pas être garantie. L'offre indique environ 50 cm d'espacement. Le groupe développé doit garder de l'air et ne pas être aussitôt couvert par des voisins étalés.

Du soleil et un drainage sous toute la motte

Le soleil et un emplacement de jardin aussi abrité que possible sont favorables. La terre peut être nourissante mais doit évacuer fiablement l'eau en excès. Surtout en hiver, froid et racines mouillées peuvent devenir problématiques. Observe la zone après la pluie avant de planter. Une dépression lourde et longtemps saturée n'est pas un bon emplacement, même si elle est ensoleillée. Prépare une zone racinaire entière ; une petite poche meuble dans un sol dense peut accumuler l'eau. En cas de conditions difficiles, un grand contenant approprié à évacuation libre est une alternative. Là non plus, aucune zone constamment mouillée ne doit se former sous la vivace.

Planter au printemps et accompagner l'enracinement

Le printemps après les fortes gelées est un bon départ pour le jeune Black Adder, si le sol se travaille bien et n'est pas détrempé. Humidifie la motte avant de dépoter et plante à son ancienne profondeur. Referme la terre et arrose à fond. Vérifie ensuite directement la petite motte, surtout lors des jours chauds et secs. Les racines doivent encore se développer hors du volume du pot. Une agastache installée supporte mieux une sécheresse passagère ; la jeune plante du lot demande d'abord un suivi. Arrose à la base selon le besoin et laisse la terre reprendre de l'air. Contrôles plus souvent en pot, où le volume racinaire limité offre moins de réserves.

Entretenir la floraison estivale avec légèreté

En été, tu peux retirer les extrémités défleuries pour garder un groupe net. Cela peut favoriser d'autres fleurs, sans garantir une deuxième floraison à date fixe. Garde le feuillage vert sain et accompagne la plante après la taille d'un arrosage adapté après vérification. Ajuste modérément les nutriments aux besoins réels. De fortes doses d'engrais n'aident pas si l'endroit est trop sombre ou la motte constamment mouillée. Des méthodes végétatives sont judicieuses pour conserver le cultivar nommé ; le profil RHS le décrit comme stérile et mentionne division ou boutures. Un semis aléatoire n'est donc pas un moyen fiable d'obtenir de nouveaux Black Adder identiques.

L'hiver se décide à la base

Avant la saison froide, vérifie encore drainage et stabilité. Les tiges restantes peuvent protéger la base ; si le vent les fait beaucoup bouger, elles peuvent être raccourcies auparavant. Reporte plutôt la taille complète au printemps et préserve alors les nouvelles pousses basales. Pour les pots, choisis un endroit abrité dehors et assure l'évacuation de l'eau de pluie. Les indications de rusticité britanniques ne garantissent pas chaque emplacement. Dans les sites froids et humides, une perte reste possible. Évalue patiemment la base au printemps. Soleil, temps d'enracinement et bon drainage hivernal comptent plus que l'étiquette d'une vivace prétendument sûre partout.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue créée par IA de la floraison ultérieure au jardin. Fleurs et développement au jardin ne sont pas promis pour la livraison.



Photo originale inchangée du jeune Black Adder. Elle montre un stade de développement, pas une promesse de fleurs à chaque livraison ; quantité selon le lot choisi.

Bon à savoir

Black Adder est-il une *Agastache rugosa* pure ?

La boutique emploie *rugosa*, mais les sources spécialisées présentent *Agastache Blackadder* comme hybride de jardin. L'attribution à une espèce pure reste donc explicitement non confirmée.

Blackadder et Black Adder sont-ils identiques ?

Dans les profils lus, ces graphies désignent le même hybride de jardin connu. Elles ne créent pas une deuxième identité de plante.

La plante livrée fleurit-elle déjà ?

La photo originale utilisée montre une jeune plante sans épis. L'image de détail décrit la floraison estivale ultérieure.

Quelle sera sa hauteur ?

La boutique indique environ 50–70 cm. Les profils spécialisés donnent env. 60–100 cm ; une croissance vigoureuse au jardin peut dépasser le repère de la boutique.

La jeune plante supporte-t-elle la sécheresse ?

La petite motte livrée doit d'abord s'enraciner. Par temps sec, vérifie-la et arrose à fond ; la tolérance des plantes plus âgées ne s'applique pas encore.

Black Adder est-il rustique partout ?

Non, des sols froids et humides peuvent entraîner sa perte. Soleil, abri et excellent drainage hivernal sont importants ; les pots demandent plus d'attention.

Quand tailler ?

Effectuer de préférence la taille complète au printemps en préservant les nouvelles pousses basales. Les tiges secouées par le vent peuvent être raccourcies avant.

Puis-je conserver le cultivar par semis ?

La RHS le décrit comme stérile. Division ou boutures adaptées conviennent mieux au maintien du cultivar nommé qu'un semis non confirmé.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique