

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Cordyline rouge : des feuilles étroites et un hivernage sûr

Cordyline australis Red Star crée des accents nets sur terrasse et balcon avec ses éventails de feuilles rouge-brun. La jeune plante commence sans haut tronc ; lumière, arrosages contrôlés et hivernage frais lui permettent de se développer sur plusieurs années.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 12 cm · 40-50 cm. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Cordyline australis 'Red Star'

Cordyline rouge : des feuilles étroites et un hivernage sûr

Cordyline australis Red Star crée des accents nets sur terrasse et balcon avec ses éventails de feuilles rouge-brun. La jeune plante commence sans haut tronc ; lumière, arrosages contrôlés et hivernage frais lui permettent de se développer sur plusieurs années.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 12 cm · 40-50 cm. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Classification botanique	Cordyline australis 'Red Star'
Famille	Asparagaceae
Origine	Forme cultivée de Cordyline australis, originaire de Nouvelle-Zélande
Taille de livraison	Pot de 12 cm · 40-50 cm
Port et particularité	Touffes de feuilles d'abord près du sol, puis formation lente d'un tronc ; feuilles étroites rouge foncé à bronze

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Lumineux, ensoleillé à mi-ombragé ; habituer au soleil.	Éviter les changements brusques de lumière après l'hiver.
Eau	Arroser uniformément selon les besoins et retirer l'excédent.	Consommation plus élevée en été, nettement moindre pendant l'hiver frais.
Terre	Terreau de bac stable et drainant.	Les racines ont besoin d'humidité et d'air ensemble.
Contenant	Stable, drainé et suffisamment profond à mesure de la croissance.	Les longues feuilles exercent un effet de levier sur un petit pot.
Engrais	Seulement pendant la croissance active selon les indications du produit.	Ne pas ignorer le repos hivernal avec des apports supplémentaires.
Hiver	Rentrer à temps dans un endroit lumineux, frais et hors gel.	Les petits pots ne sont pas sûrement rustiques.
Contrôle	Examiner les aisselles foliaires pour repérer acariens et cochenilles à bouclier ou farineuses.	Observer régulièrement, surtout sous verre.
Animaux de compagnie	Empêcher chiens et chats de grignoter.	Les parties de la plante sont toxiques par ingestion.

Un savoir qui grandit

Un effet de palmier sans être un palmier

Cordyline australis appartient aux Asparagacées. L'espèce vient de Nouvelle-Zélande ; Red Star est une forme cultivée aux feuilles étroites rouge-brun à bronze. Les jeunes plantes forment une touffe dense près du substrat, tandis qu'un tronc visible ne peut se développer qu'au fil des années. Malgré l'effet de palmier, il ne s'agit pas d'un palmier. Elle ne doit pas non plus être assimilée à la *Cordyline fruticosa* tropicale à larges feuilles. Ses feuilles étroites et retombantes lui donnent un contour fin et animé.

Bien utiliser la jeune taille de livraison

L'offre choisie indique un pot de 12 cm et environ 40–50 cm de hauteur totale. L'éventail de feuilles peut largement dépasser les côtés du petit pot. Un contenant stable est utile sans imposer de placer aussitôt la plante dans un volume de terre excessif. Sa taille reste compréhensible près de meubles bas de terrasse. La scène montre une idée de composition avec un contenant supplémentaire et de la décoration. De grandes inflorescences futures ou un haut tronc ne sont pas promis pour la jeune plante livrée ; en bac, la floraison n'est de toute façon pas un objectif d'entretien fiable.

L'habituer progressivement à la lumière estivale

Un emplacement extérieur lumineux, ensoleillé à mi-ombragé, convient bien. Après une période sous verre ou dans le quartier d'hiver, habituez progressivement la plante au soleil intense. Une place abritée limite les dégâts dus au frottement marqué des longues feuilles dans le vent. Pour une culture intérieure durable, une véranda très lumineuse et plutôt fraîche est envisageable ; une étagère peu éclairée ne convient pas. Choisissez un terreau de bac stable et drainant. Lors des rempotages suivants, prévoyez assez de profondeur pour les racines et assurez une évacuation libre de l'eau.

Plus en été, moins pendant l'hiver frais

Vérifiez l'humidité de la motte avant d'arroser. Pendant les phases chaudes et lumineuses, la plante consomme davantage d'eau et ne doit pas sécher complètement. Arrosez uniformément selon les besoins et retirez l'excédent du cache-pot. Pendant un hivernage frais, la terre sèche plus lentement et l'eau est donc nécessaire moins souvent. La règle de base reste la même dans les deux saisons : ni constamment mouillé ni complètement desséché. Fertilisez seulement lorsque la croissance est réelle, selon les indications du produit ; n'imposez pas d'apports supplémentaires pendant le repos hivernal.

Tolérer le gel n'invite pas à laisser geler toute la motte

Red Star n'est pas une plante en bac sûrement rustique dans toutes les situations allemandes. Quelques nuits de gel modéré et une petite motte entièrement gelée représentent des contraintes très différentes. Prévoyez donc un hivernage lumineux, frais et hors gel, et rentrez-la à temps avant les gels plus forts. Examinez auparavant feuilles et aisselles foliaires pour repérer les parasites. Dans le quartier d'hiver, veillez à la circulation d'air et à une humidité modérée. Un débarras chaud et sombre ne serait pas une bonne solution. Au printemps, ne la ressortez progressivement qu'avec un temps adapté.

Retirer proprement les vieilles feuilles et rechercher les causes

Les feuilles inférieures mortes peuvent être retirées doucement sans arracher les tissus sains. Ne coupez pas inutilement les pointes abîmées plus loin dans la feuille fraîche. En présence de zones brunes, vérifiez d'abord sécheresse, excès d'eau, froid et dégâts mécaniques. Sous verre, tétranyques et cochenilles à bouclier ou farineuses peuvent apparaître ; des contrôles réguliers aident à repérer tôt les changements. Les feuilles sont toxiques par ingestion pour les chiens et les chats. Une place sûre fait donc partie de l'aménagement. La patience préserve mieux la structure naturelle que de fréquentes interventions fortes sur la jeune touffe de feuilles.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : cordyline rouge. Pot de 12 cm · 40-50 cm. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Red Star est-elle un palmier ?

Non. Cordyline australis appartient aux Asparagacées et développe simplement une forme rappelant un palmier.

Peut-elle rester dehors en hiver ?

Pour le petit bac, nous recommandons un emplacement lumineux, frais et hors gel. La tolérance au gel modéré ne garantit pas la survie d'un pot entièrement gelé.

Pourquoi la jeune plante n'a-t-elle pas de haut tronc ?

Un tronc visible se développe seulement avec l'âge. Les jeunes plantes sont proposées sous forme de touffe de feuilles près du sol.

Convient-elle à une pièce sombre ?

Non. Même en culture intérieure, elle demande beaucoup de lumière ; une véranda lumineuse et fraîche convient mieux qu'une pièce sombre et chaude.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Lien vers l'offre en allemand. Consultez la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de la livraison.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique (en
allemand)