

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Érable du Japon Bloodgood : feuillage sombre et structure arbustive aérée

Bloodgood porte des feuilles palmées rouge pourpre foncé aux lobes étroitement pointus. En automne, le feuillage devient plus rouge ; un jardin clair abrité et une humidité du sol équilibrée alimentent bien la jeune couronne.



Scène de jardin créée par IA d'après la photo commerciale originale. Deux jeunes érables aux couronnes ouvertes rouge pourpre correspondant au lot. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris. Ce n'est pas une photo produit à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Acer palmatum 'Bloodgood'

Érable du Japon Bloodgood : feuillage sombre et structure arbustive aérée

Bloodgood porte des feuilles palmées rouge pourpre foncé aux lobes étroitement pointus. En automne, le feuillage devient plus rouge ; un jardin clair abrité et une humidité du sol équilibrée alimentent bien la jeune couronne.



Scène de jardin créée par IA d'après la photo commerciale originale. Deux jeunes érables aux couronnes ouvertes rouge pourpre correspondant au lot. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris. Ce n'est pas une photo produit à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Nom botanique	Acer palmatum 'Bloodgood'
Taille livrée	2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris
Port	Arbuste buissonnant à petit arbre vivace caduc, avec généralement cinq à sept lobes foliaires pointus
Hauteur attendue	Environ 2,5–4 m de hauteur et largeur après de nombreuses années ; taille, emplacement et culture en contenant influencent le développement
Floraison	Petites fleurs pourpres au printemps sur les plantes développées ; fruits ailés possibles ensuite
Couleur des fleurs	Petites fleurs pourpres ; feuillage rouge pourpre et feuilles rouges d'automne constituent le principal ornement
Plantation	Jours doux sans gel en période sans feuilles, de l'automne au début du printemps ; soigner particulièrement les plantes en conteneur plantées à une autre période
Espacement	Environ 2,5–4 m pour des sujets libres isolés, selon la largeur future de la couronne

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Feuillage	Évaluer le feuillage sombre d'été et la couleur plus rouge d'automne au fil de l'année.	La couleur change avec le développement et l'emplacement.
Lumière	Choisir un endroit clair abrité au soleil doux ou à mi-ombre.	Obscurité profonde et chaleur desséchante sont des contraintes différentes.
Place	Prévoir largement la future couronne de 2,5–4 m.	La jeune couronne ouverte livrée ne reste pas toujours aussi petite.
Terre	Offrir une terre humifère légèrement acide à neutre et drainante.	Les racines fines demandent des réserves sans eau stagnante.
Eau	Contrôler la motte et arroser selon son humidité plutôt qu'un programme hebdomadaire.	Vent et soleil modifient les besoins des petits contenants.
Engrais	Distinguer réserves du sol et contenants utilisés depuis longtemps.	L'engrais ne remplace ni lumière ni eau.
Taille	Intervenir précisément seulement sur les parties gênantes ou mortes.	La structure buissonnante naturelle n'exige pas une taille annuelle radicale.
Gel tardif	Protéger temporairement les nouvelles pousses lors des nuits froides.	La résistance hivernale au repos ne s'applique pas de la même manière aux jeunes feuilles.
Hiver	Garder les contenants à l'abri avec évacuation libre et contrôler hors gel.	La chute des feuilles n'abolit pas les besoins des racines vivantes.

Un savoir qui grandit

Le feuillage sombre garde son dessin fin

Bloodgood montre des feuilles rouge pourpre foncé aux lobes élancés pointus, généralement cinq à sept. Malgré l'impression sombre, de fines nervures et des bords dentés restent visibles. La variété appartient au groupe Amoenum de l'érable du Japon. En automne, la nuance peut devenir davantage rouge avant que les feuilles ne tombent. Bloodgood associe cet effet sombre à une ramification naturellement buissonnante. Sa structure se révèle mieux si l'on distingue encore lumière et feuilles individuelles entre les branches.

Un lot commence par deux jeunes couronnes

La variante commerciale actuelle comprend deux plantes, chacune en pot de 19 cm et d'environ 70 cm de hauteur totale pot compris. La photo originale propre montre de jeunes couronnes lâches au-dessus de petits troncs courts et fins. Cette phase diffère d'un arbuste de jardin développé de 2,5–4 m de hauteur et de largeur semblable. Les deux plantes peuvent avoir chacune leur place. Au déballage, examinez les branches et dégagez doucement l'emballage du feuillage. Soulevez le sujet par le pot ; les fines extrémités ne sont pas des poignées. Sans feuilles en hiver, le même jeune érable paraît bien plus sobre.

Un peu de soleil sans chaleur desséchante

Bloodgood peut supporter soleil et mi-ombre. Un endroit clair abrité avec soleil doux est plus facile à alimenter qu'un mur brûlant balayé de vent sec. L'ombre profonde durable peut modifier l'effet sombre du feuillage, mais davantage de chaleur à midi n'améliore pas automatiquement les choses. Observez ensemble le déroulement de la journée sur place et l'humidité de la motte. Pour un sujet isolé libre, environ 2,5–4 m de distance est un repère issu de sa largeur future. Éloignez aussi la jeune couronne des passages où l'on frôle sans cesse ses branches.

Une motte aérée conserve des réserves

Une terre humifère légèrement acide à neutre avec bonne évacuation d'eau convient. Lors de la plantation, la surface de la motte reste à la hauteur précédente ; l'érable à racines superficielles ne doit pas disparaître sous de nouvelles couches de terre. Les jours doux sans gel de l'automne au début du printemps sont favorables à la plantation sans feuilles. Arrosez abondamment après installation et gardez d'abord l'entourage libre de concurrence racinaire dense. Pour une culture prolongée en contenant, un pot de 19 cm rempli de racines demande un jour plus de place. Choisissez le suivant selon la motte avec trous libres plutôt que de mettre une petite plante dans un immense volume constamment mouillé.

La couleur des feuilles ne mesure pas l'humidité

Contrôlez la terre du contenant et l'ancienne motte en massif. La sécheresse peut brunir et recroqueviller les bords, surtout avec vent ou soleil intense. Arrosez lentement en profondeur au besoin puis laissez évacuer l'eau. Une terre mouillée près du pot ou une courte pluie sur la couronne ne prouvent pas que l'intérieur est bien alimenté. À l'inverse, n'arrosez pas systématiquement une motte déjà mouillée. Les apports dépendent du sol et de la culture en contenant ; un bon emplacement de jardin n'exige pas un programme universel d'engrais. Davantage d'engrais ne rétablit pas sûrement la couleur sombre sous une mauvaise exposition.

Quelques décisions suffisent pour la forme

Bloodgood devient un arbuste buissonnant à petit arbre. Laissez d'abord les branches saines trouver leur place. Si des parties mortes, abîmées ou croisées gênantes doivent être traitées, coupez précisément en regardant la direction future du rameau latéral restant. Une forte taille générale au printemps ne convient pas à cette silhouette naturelle fine. Pour les interventions nécessaires, la fin d'automne jusqu'au milieu de l'hiver est une période judicieuse, hors montée de sève printanière plus sensible. Petites fleurs pourpres et plus tard fruits ailés rougeâtres appartiennent à la plante développée ; leur présence n'est pas garantie pour la jeune livraison.

Les feuilles rouges d'automne peuvent partir

En automne, le feuillage sombre devient plus rouge puis tombe. C'est le repos hivernal, pas une raison de déplacer la plante dans une pièce chauffée. En contenant, protégez les racines lors des grands gels et installez le pot à l'abri avec évacuation libre. Un contrôle d'humidité reste nécessaire les jours secs sans gel. Les nouvelles pousses printanières peuvent être protégées temporairement si un gel tardif est annoncé. Après des dégâts, vérifiez d'abord quelles pousses repartent. Un flétrissement inhabituel durable demande, outre météo et eau, d'examiner racines et maladies possibles ; un diagnostic fixe tiré de la seule couleur serait peu fiable.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail foliaire créé par IA d'après la photo commerciale originale.
Vue saisonnière agrandie, pas une plante livrée plus grande ni
une couleur garantie permanente. Environnement non inclus.

Photo commerciale originale propre inchangée. Deux jeunes érables au feuillage sombre ; feuilles et couleurs changent selon saison et culture. Repère livré : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris.

Bon à savoir

Bloodgood reste-t-il toujours aussi sombre ?

L'été est surtout rouge pourpre, le feuillage devient plus rouge en automne. Emplacement et développement influencent les nuances réelles.

Les deux plantes sont-elles deux variétés ?

Non. Le lot contient deux sujets de Bloodgood. Chacun peut avoir son emplacement de jardin adapté.

Pourquoi faudra-t-il plus de place que 70 cm ?

Cette indication décrit la hauteur totale livrée, pot de 19 cm compris. Une couronne développée peut atteindre environ 2,5-4 m de hauteur et largeur.

L'érable peut-il être au soleil ?

Oui, si exposition et humidité du sol conviennent. Un soleil doux abrité est plus facile à accompagner qu'un mur chaud sec.

Davantage d'engrais et d'eau guérissent-ils chaque feuille brune ?

Non. Vérifiez d'abord motte, drainage, soleil et vent ; ajouter de l'eau à une terre mouillée n'est pas une solution automatique.

Faut-il une pièce chaude en hiver ?

Non. L'érable de jardin caduc se repose en hiver. En contenant, on protège surtout racines et évacuation d'eau.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique