

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Érable du Japon Sumi-nagashi : feuilles profondément lobées et couronne qui s'élargit

Sumi-nagashi porte des feuilles profondément découpées, généralement à sept lobes, aux nouvelles pousses rouge pourpre et aux tons estivaux plus sombres. Sa jeune couronne verticale s'élargit avec les années et termine l'automne en rouge intense.



Scène de jardin créée par IA d'après la photo commerciale originale. Deux jeunes érables à ramification ouverte avec nuances rougeâtres saisonnières mêlées, correspondant au lot. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris. Ce n'est pas une photo produit à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Acer palmatum 'Sumi-nagashi'

Érable du Japon Sumi-nagashi : feuilles profondément lobées et couronne qui s'élargit

Sumi-nagashi porte des feuilles profondément découpées, généralement à sept lobes, aux nouvelles pousses rouge pourpre et aux tons estivaux plus sombres. Sa jeune couronne verticale s'élargit avec les années et termine l'automne en rouge intense.



Scène de jardin créée par IA d'après la photo commerciale originale. Deux jeunes érables à ramification ouverte avec nuances rougeâtres saisonnières mêlées, correspondant au lot. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris. Ce n'est pas une photo produit à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Nom botanique	Acer palmatum 'Sumi-nagashi'
Taille livrée	2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris
Port	Petit arbre vivace caduc, d'abord plutôt vertical à forme de vase puis plus large, aux feuilles profondément lobées généralement à sept lobes
Hauteur attendue	Environ 2,5–4 m de hauteur et largeur au fil de nombreuses années ; culture et emplacement influencent la taille réelle
Floraison	Petites fleurs discrètes au printemps sur les plantes développées ; fruits ailés possibles ensuite
Couleur des fleurs	Aucune couleur florale spectaculaire annuelle garantie ; rouge pourpre, rouge sombre et rouge vif d'automne déterminent l'effet foliaire
Plantation	Jours doux sans gel en période sans feuilles, de l'automne au début du printemps ; soigner particulièrement les plantes en conteneur plantées à une autre période
Espacement	Environ 2,5–4 m pour sujets libres isolés, selon la largeur future de la couronne ; réserver la place pour des branches qui s'élargissent

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Feuillage	Observer ensemble nouvelles pousses, été plus sombre et automne plus rouge.	La variété suit une évolution dans le temps plutôt qu'une nuance photographique fixe.
Place	Prévoir une couronne future large de 2,5-4 m.	La jeune structure verticale s'élargit avec les années.
Lumière	Choisir une mi-ombre lumineuse abritée ou du soleil doux.	Chaleur et vent sec peuvent solliciter les feuilles finement lobées.
Terre	Utiliser une terre humifère légèrement acide à neutre et drainante.	Les racines demandent réserves d'eau et air.
Plantation	Installer la motte à sa hauteur précédente et arroser soigneusement.	Les racines principales superficielles ne doivent pas être profondément enterrées.
Eau	Alimenter lentement en profondeur selon humidité de la motte et météo.	Une terre mouillée à côté ne prouve pas une humidité suffisante dans la motte originale.
Engrais	Distinguer besoins du sol et du contenant, suivre l'étiquette.	Les nutriments supplémentaires ne corrigent pas des dégâts dus au soleil ou à la sécheresse.
Taille	Faire peu d'interventions ciblées au besoin, entre fin d'automne et milieu d'hiver.	La forme naturelle d'arbre qui s'élargit n'est pas une erreur de taille.
Hiver	Protéger les racines en contenant et couvrir temporairement les jeunes pousses lors du gel tardif.	Bois dormant et feuilles nouvelles n'ont pas la même sensibilité.

Un savoir qui grandit

Les découpes profondes allègent la feuille

Sumi-nagashi possède des feuilles profondément lobées, généralement à sept parties. Les sections étroites et les bords dentés paraissent fins bien que la feuille développée puisse être remarquable. Le départ est rouge pourpre ; des tons lie-de-vin plus sombres peuvent suivre en été et un rouge intense en automne. La variété appartient au groupe Matsumurae de l'érable du Japon. L'original montre sur la jeune plante plusieurs âges foliaires à la fois : extrémités nouvelles rougeâtres, zones anciennes plus atténuées et ramification ouverte. Un mélange saisonnier se distingue donc d'un état photographique uniformément rouge permanent.

Deux jeunes plantes avant la couronne plus large

L'offre liée contient deux plantes, chacune en pot de 19 cm, d'environ 70 cm de hauteur totale contenant compris. La photo originale propre inchangée montre les deux jeunes érables à structure initiale fine. Plus tard, une silhouette de petit arbre d'environ 2,5-4 m de hauteur et largeur peut se développer. Jeune, Sumi-nagashi paraît plutôt vertical à forme de vase ; la ramification latérale augmente avec les années. Cette largeur appartient tôt à la planification du jardin. Soulevez chaque sujet par son contenant, libérez l'emballage sans tirer sur les feuilles fines et vérifiez la motte originale avant plantation.

La largeur future commence par l'emplacement

Une mi-ombre lumineuse abritée convient à l'effet du feuillage. Du soleil doux est possible avec humidité fiable, mais un mur chaud sec est plus difficile. Vent sec et fort soleil peuvent abîmer les bords, surtout avec manque d'eau. Pour un sujet libre, environ 2,5-4 m d'écartement servent de repère selon la largeur future de la couronne. Les deux plantes du lot n'ont pas à partager un coin étroit. Choisissez des lieux où les futures branches ne devront pas être constamment raccourcies près des fenêtres ou passages. La forme naturelle s'accompagne mieux si cette place existe dès le début.

Une terre humifère laissant la place aux racines superficielles

Une terre légèrement acide à neutre, humifère et drainante retient l'eau tout en restant aérée. Installez la motte à sa hauteur antérieure ; les principales racines superficielles ne doivent pas disparaître sous de profondes couches ajoutées. Des jours doux sans gel de l'automne au début du printemps conviennent à la phase sans feuilles. Une plante en conteneur installée plus tard peut aussi s'enraciner, mais demande davantage d'attention à la météo et à la petite motte. Arrosez abondamment après plantation. Une couverture organique meuble reste éloignée de la base du tronc et ne justifie pas de l'envelopper de matériel humide.

Évaluer l'humidité à partir de la motte

En contenant comme après plantation, vérifiez surtout la zone racinaire originale. La terre voisine ou une courte pluie sur la couronne renseignent peu sur ses réserves internes. Arrosez lentement en profondeur lorsque la terre sèche et laissez s'évacuer l'excédent. Cet érable fin ne doit ni sécher complètement ni rester dans un cache-pot mouillé. Un été chaud venteux peut demander des contrôles fréquents des petits contenants. Les apports nutritifs suivent besoins du sol ou du pot et l'étiquette. Des bords bruns ne prouvent pas une carence : eau, soleil et vent passent d'abord dans l'examen.

Du jeune V au petit arbre

La forme initiale de vase s'élargit ensuite. Il n'est pas nécessaire d'empêcher cette évolution en coupant régulièrement toutes les extrémités. Retirez au besoin précisément les branches mortes, abîmées ou croisées gênantes, en ramenant une coupe à un rameau latéral adapté. Les interventions nécessaires conviennent entre fin d'automne et milieu d'hiver ; le début de la montée de sève printanière ne convient pas à une forte taille générale. Si la motte est dense, prenez un contenant un peu plus grand et renouvelez la terre. Un petit pot limite la place mais ne remplace pas de façon fiable une culture adaptée de l'arbre.

Accepter rouge d'automne et branches nues d'hiver

Le rouge d'automne plus intense mène à une chute naturelle des feuilles. Sumi-nagashi a ensuite besoin de son repos hivernal dans le cycle du jardin adapté. Protégez les racines en contenant lors des grands gels, gardez le drainage libre et vérifiez l'humidité les jours secs sans gel. Une pièce chauffée ne convient pas pour l'hiver. Les nouvelles feuilles printanières peuvent souffrir du gel tardif malgré la rusticité du bois au repos ; une protection adaptée temporaire aide lors des nuits froides annoncées. Après des dégâts, l'évolution réelle compte. Petites fleurs et plus tard fruits ailés appartiennent à une plante assez développée et ne sont pas garantis pour ce jeune lot.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo commerciale originale propre inchangée. Deux jeunes plantes au feuillage d'âges différents ; feuilles et nuances changent au fil de l'année. Repère livré : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris.



Détail foliaire créé par IA d'après la photo commerciale originale. Vue saisonnière agrandie, pas une plante livrée plus grande ni une couleur garantie permanente. Environnement non inclus.

Bon à savoir

Pourquoi un jeune Sumi-nagashi paraît-il encore étroit ?

La couronne commence plutôt verticale à forme de vase puis s'élargit avec les années. Cela correspond au développement décrit.

Faut-il attendre un rouge toujours uniforme ?

Non. Âge des feuilles et saison apportent des phases pourpres, sombres et rouge vif ; la jeune plante originale peut porter plusieurs nuances à la fois.

Les 70 cm sont-ils sa taille définitive ?

Non. C'est la hauteur totale livrée, pot de 19 cm compris. Au jardin, une plante développée peut atteindre environ 2,5-4 m de hauteur et largeur.

Faut-il mettre deux plantes du lot côte à côte ?

Non. Ce sont deux sujets de la même variété pouvant avoir des lieux adaptés distincts.

Faut-il raccourcir fortement et régulièrement la couronne qui s'élargit ?

Pas par principe. Prévoyez de la place et accompagnez la forme naturelle avec peu d'interventions nécessaires.

Pourquoi examiner d'abord l'humidité en cas de bords bruns ?

Sécheresse, soleil fort et vent peuvent se cumuler. Plus d'engrais seul ne corrige pas ces causes et ne constitue pas un diagnostic sûr.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique